

GUÍA DE CONSUMO

THYR+


Está formulado para personas que buscan apoyo natural a la función tiroidea, el equilibrio del estrés y el sistema inmune.



**AVISO
MÉDICO
IMPORTANTE**

THYR+, es un suplemento de apoyo tiroideo, NO un medicamento. Si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo diagnosticado y/o toma Levotiroxina (Synthroid), Metimazol u otros medicamentos tiroideos, consulte a su médico ANTES de usar. El Yodo, la Ashwagandha y la Equinácea pueden interactuar con el tratamiento tiroideo. Si toma Levotiroxina, separar la toma por al menos 4 horas.

¿Para quiénes se recomienda?



Función tiroidea en rango bajo: Brinda apoyo nutricional con yodo, selenio, L-tirosina y vitamina D3 para favorecer la función tiroidea, bajo supervisión médica.

Fatiga y metabolismo lento: La ashwagandha, el yodo y el selenio apoyan la energía y el metabolismo cuando la función tiroidea es baja.

Estrés crónico y salud tiroidea: La ashwagandha ayuda al organismo a adaptarse al estrés y favorece el equilibrio de la función tiroidea.

Defensas bajas o infecciones frecuentes: La equinácea, el saúco, el ajo y la vitamina C apoyan las defensas naturales del organismo.

Adultos mayores de 50 años: La vitamina D3, el selenio y el yodo apoyan el metabolismo, la función tiroidea y el sistema inmunitario durante el envejecimiento.

Enfoque preventivo y nutricional: Ideal para quienes desean cuidar su salud tiroidea, especialmente si existen antecedentes familiares de hipotiroidismo.

Complemento del tratamiento tiroideo: Puede utilizarse como apoyo nutricional, nunca como sustituto del tratamiento médico. Mantenga un intervalo de al menos 4 horas con la levotiroxina y consulte a su médico.

Cómo tomarla



01 - Toma 2 cápsulas por la mañana, después del desayuno, la Vitamina D3 se absorbe mejor con grasas alimentarias.



02 - Acompáñalas con agua a temperatura ambiente. No tomar con jugo de toronja, inhibe enzimas hepáticas.



03 - Si tomas Levotiroxina, respeta el intervalo de 4 horas. La Levotiroxina se toma en ayunas. THYR+ se toma después del desayuno.



04 - Complementa con hábitos que apoyan la tiroides. Reduce el consumo de alimentos bociógenos (soya, col o brócoli crudos).



05 - Monitorea tus niveles tiroideos. Si tienes hipotiroidismo, pide a tu médico un control de TSH, T3 y T4.

Interacciones a considerar

Levotiroxina (Synthroid, Eutirox)

SEPARAR 4 HORAS — los minerales y extractos pueden reducir la absorción de Levotiroxina. Tomar Levotiroxina en ayunas y THYR+ después del desayuno.

Metimazol / Propiltiouracilo (PTU)

Consultar al médico — el Yodo puede interferir con la eficacia de estos medicamentos para el hipertiroidismo.

Inmunosupresores

CONTRAINDICADO — la Equinácea y la Ashwagandha estimulan el sistema inmune y pueden contrarrestar el efecto

Sedantes / Ansiolíticos

Consultar al médico — la Ashwagandha puede tener efecto sedante leve y potenciar el efecto de estos medicamentos.

Embarazo / Lactancia

No recomendado — el exceso de Yodo puede afectar la tiroides fetal. Consultar con el obstetra.



CONSERVACIÓN: No exceder la dosis diaria de 2 cápsulas. Mantener en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Consultar a un médico durante el embarazo o la lactancia, si se están tomando medicamentos o si se padece alguna condición médica.

Consulte a su médico antes de usar si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo diagnosticado y/o toma medicamentos para la tiroides. Los extractos botánicos (Ashwagandha, Equinácea, Saúco) son sensibles al calor y la humedad — mantener siempre el frasco bien cerrado.

No transferir a otros envases — el frasco original protege el contenido.

NO usar como sustituto del tratamiento médico para condiciones tiroideas.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

** Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.*